

**Sommaire du statut de l'espèce  
du COSEPAC**

sur la

**Limace-sauteuse glanduleuse**  
*Hemphillia glandulosa*

au Canada

**PRÉOCCUPANTE**  
2013

**COSEPAC**  
Comité sur la situation  
des espèces en péril  
au Canada



**COSEWIC**  
Committee on the Status  
of Endangered Wildlife  
in Canada

Les sommaires du statut de l'espèce du COSEPAC sont des documents de travail servant à déterminer le statut des espèces sauvages au Canada que l'on croit en péril. On peut citer le présent document de la façon suivante :

COSEPAC. 2013. Sommaire du statut de l'espèce du COSEPAC sur la Limace-sauteuse glanduleuse (*Hemphillia glandulosa*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xxiii p. ([www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default\\_f.cfm](http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default_f.cfm)).

**Note de production :**

Le COSEPAC remercie Kristiina Ovaska d'avoir rédigé le sommaire du statut de la limace-sauteuse glanduleuse (*Hemphillia glandulosa*) au Canada. La supervision et la révision de ce sommaire de statut ont été assurées par Gerald L. Mackie, coprésident du Sous-comité de spécialistes des mollusques du COSEPAC.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, s'adresser au :

Secrétariat du COSEPAC  
a/s Service canadien de la faune  
Environnement Canada  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0H3

Tél. : 819-953-3215  
Télec. : 819-994-3684  
Courriel : [COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca](mailto:COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca)  
<http://www.cosepac.gc.ca>

Also available in English under the title COSEWIC Status Appraisal Summary on the Warty Jumping-slug *Hemphillia glandulosa* in Canada.

©Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2013.  
N° de catalogue CW69-14/2-36-2013F-PDF  
ISBN 978-0-660-21078-0



Papier recyclé



## COSEPAC Sommaire de l'évaluation

### Sommaire de l'évaluation – mai 2013

**Nom commun**

Limace-sauteuse glanduleuse

**Nom scientifique**

*Hemphillia glandulosa*

**Statut**

Préoccupante

**Justification de la désignation**

Cette petite limace a une aire de répartition restreinte et fragmentée sur l'île de Vancouver, où elle atteint la limite septentrionale de son aire de répartition. La perte et la fragmentation de son habitat, principalement dues à l'exploitation forestière, perturbent les conditions d'ombre et d'humidité du tapis forestier et les débris ligneux grossiers essentiels aux limaces, et peuvent restreindre la dispersion. Le développement résidentiel et récréatif est considéré comme une nouvelle menace le long de la côte sud-ouest de l'île. Le faible nombre de populations dispersées l'expose aux perturbations naturelles et anthropiques.

**Répartition**

Colombie-Britannique

**Historique du statut**

Espèce désignée « préoccupante » en mai 2003. Réexamen et confirmation du statut en mai 2013.



COSEPAC

## Sommaire du statut de l'espèce

*Hemphillia glandulosa*

Limace sauteuse glanduleuse

Compétence : Colombie-Britannique

Warty Jumping-slug

### Historique du statut :

Espèce désignée « préoccupante » en mai 2003. Statut réexaminé et confirmé en mai 2013.

### Preuves (préciser le cas échéant) :

Les activités de recherche supplémentaires n'ont produit qu'un faible nombre de nouvelles observations, la zone d'occurrence et l'IZO établis en 2003 ne s'en trouvant que légèrement modifiés. Les menaces se sont quelque peu accrues, mais rien n'indique qu'il y ait eu baisse d'effectifs ou perte de populations.

### Espèce sauvage :

Changement quant à l'admissibilité, à la taxinomie ou aux unités désignables : oui ☐ non ☒

#### Explication :

Aucun changement n'a été apporté à la taxinomie officielle du *Hemphillia glandulosa*, et sa population canadienne demeure une seule unité désignable.

Wilke (2004) a réalisé des analyses de l'ADN mitochondrial (COI, 16S) du complexe *Hemphillia glandulosa* – *H. burringtoni*. L'étude portait sur des spécimens de l'ensemble de l'aire de répartition de ces limaces dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique (deux sites dans l'île de Vancouver), l'ouest de l'État de Washington, et le nord-ouest de l'Oregon. Les analyses ont révélé la présence de deux clades principaux et de 15 sous-clades (dont 8 se trouvant chacun dans un lieu géographique distinct aux États-Unis), et aucun ne correspondait aux divisions des deux espèces nominatives telles qu'identifiées selon la morphologie. Un sous-ensemble de spécimens ont été disséqués et se sont révélés anatomiquement similaires, quels que soient le site où ils ont été prélevés, le clade auquel ils appartiennent et l'espèce à laquelle ils ont été assignés. Les spécimens de l'île de Vancouver appartenaient au plus grand des deux clades principaux, dont la répartition s'étend vers le sud à travers la péninsule Olympic, dans l'État de Washington, jusque sur la côte de l'Oregon, tandis que l'autre clade principal consistait en des populations de l'intérieur réparties dans l'État de Washington et en Oregon. Les spécimens de l'île de Vancouver étaient groupés dans un même sous-clade avec les spécimens de la côte nord-ouest de la péninsule Olympic, mais pas avec ceux du reste de la péninsule. L'auteur n'a pas obtenu de résultat corroborant la division du complexe d'espèces en *H. glandulosa* et *H. burringtoni*, mais a signalé que les distances génétiques entre certaines des lignées étaient suffisantes pour éventuellement justifier leur élévation au rang d'espèces. Tous les spécimens de ce complexe provenant de l'île de Vancouver ont dans le passé été identifiés comme appartenant à l'espèce *H. glandulosa*, ce qui fait que cette information n'a pas d'impact sur la nomenclature utilisée pour l'espèce au Canada.



**Répartition :**

Changement de la zone d'occurrence :	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>
Changement de la zone d'occupation :	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>
Changement du nombre de localités actuelles connues ou inférées :	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>
Nouvelles données importantes issues de relevés :	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>

**Explication :**

De nombreux relevés de gastéropodes terrestres ont été réalisés dans l'île de Vancouver depuis la préparation du dernier rapport de situation sur le *H. glandulosa* (COSEPAC, 2003) (annexe 1). Ils comprennent des relevés annuels effectués dans le réseau de parcs et de sentiers du District régional de la capitale (DRC) depuis 2006 (Ovaska et Sopuck, 2006a, 2007b, 2008b, 2009a, 2010, 2012), qui se concentrent sur la détection de la limace-prophyse bleu-gris (*Prophysaon coeruleum*), espèce qui est présente avec le *H. glandulosa* à certains sites et qui occupe des micromilieus humides similaires sur le tapis forestier. Des relevés ont aussi été réalisés dans la réserve de parc national Pacific Rim, notamment dans les secteurs de Long Beach et du sentier West Coast (Ovaska et Sopuck, 2005, 2007d), d'autres terres fédérales (Ovaska et Sopuck, 2007a, 2009c), des sites forestiers expérimentaux (Ovaska et Sopuck, 2006c, 2007c, 2008c), et dans le cadre de travaux de terrain concernant des gastéropodes terrestres en péril effectués dans diverses parties de l'île et zones adjacentes (Ovaska et Sopuck, 2004a, 2006b, 2008a). Les relevés effectués dans la réserve de parc national Pacific Rim et ceux entrepris par le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique (Ovaska et Sopuck, 2006b) se sont concentrés sur l'habitat potentiel de la limace-sauteuse dromadaire (*H. dromedarius*), espèce dont l'habitat chevauche celui du *H. glandulosa* et qui est parfois présente avec lui.

Les relevés susmentionnés ont produit 11 nouvelles mentions pour le *H. glandulosa* dans la période 2003 – 2011; deux de ces mentions concernent des sites connus, et les autres concernent quatre sites nouveaux (annexe 2). Les nouveaux sites sont le ruisseau Noyse (une mention pour chacun de deux sous-sites) et Bamfield (deux mentions), deux sites se trouvant sur la côte ouest de l'île, le parc régional East Sooke (une mention pour chacun de trois sous-sites), et l'emprise du sentier Galloping Goose près de la rivière Sooke (deux mentions). Les deux dernières mentions accroissent la répartition canadienne connue de l'espèce légèrement vers le sud-est. Les nouveaux sites accroissent aussi légèrement l'indice de zone d'occupation connu. Cependant, comme ces changements découlent d'activités de recherche accrues, il n'y a pas lieu de présumer que l'espèce a connu un accroissement de son aire de répartition. L'espèce a encore été trouvée au petit nombre de sites qui ont été revisités sur la côte sud-ouest humide de l'île, à l'exception d'un site (baie Pachena; annexe 2). Au total, avec les 4 nouveaux sites, l'espèce a été à ce jour observée à 17 sites, dont 3 sites seulement historiques (figure 1; annexe 2).

**Information sur la population :**

Changement du nombre d'individus matures :	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>
Changement de la tendance de la population totale :	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>
Changement quant à la gravité de la fragmentation de la population :	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>
Changement de la tendance quant à la superficie ou à la qualité de l'habitat :	oui <input type="checkbox"/>	non <input checked="" type="checkbox"/>
Nouvelles données importantes issues de relevés :	oui <input checked="" type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>

**Explication :**

Le nombre d'individus matures demeure inconnu, et il y a peu de données sur les effectifs. À la plupart des sites, seulement un petit nombre d'individus ont été trouvés (annexe 2), quoique l'espèce peut être localement abondante à des sites humides propices dans certaines zones (COSEPAC, 2003). La répartition de l'espèce est notoirement éparse tant à l'échelle locale qu'aux échelles plus vastes. Elle peut être plus continue dans les forêts côtières humides de la côte ouest de l'île de Vancouver (COSEPAC, 2003), mais ces forêts ont été largement fragmentées par l'exploitation forestière. Les populations de l'intérieur et de la côte est de l'île sont isolées les unes des autres par les installations et activités humaines, le terrain accidenté ou des milieux autrement non propices, et

peuvent être de petite taille. On ne sait pas si les populations sont gravement fragmentées, au sens de l'UICN, mais c'est une possibilité. On ne dispose pas d'information sur les tendances des populations. Le déclin continu de la qualité et de la quantité de l'habitat de l'espèce dû à l'exploitation forestière et au développement résidentiel laisse croire à un déclin historique et continu, mais non attesté, de la taille des effectifs de cette limace (voir **Menaces**).

**Menaces :**

Changement de la nature ou de la gravité des menaces :

oui ☒ non ☐

Explication :

L'exploitation forestière a déjà été considérée comme une menace pour le *H. glandulosa* (COSEPAC, 2003), et elle continue d'altérer son habitat dans l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce dans l'île de Vancouver. Le taux de perte de forêt dans l'île de Vancouver est le plus élevé de la province; la perte nette de la superficie de vieille forêt (> 140 ans), recrutement pris en compte, a été de 25,8 % dans l'ouest et le nord, et de 24,0 % dans l'est de l'île sur les 30 années de la période 1978–2008 (modèle 3 dans Long *et al.*, 2011; pourcentages calculés pour les zones s'étendant jusqu'à 50 km de la côte). L'exploitation forestière se poursuit dans les vieilles forêts restantes et les forêts de seconde venue en maturation de l'île, notamment dans l'habitat de l'espèce. Bien que celle-ci ne soit pas confinée aux vieilles forêts, elle a besoin d'un tapis forestier humide propice et d'abris, comme ceux que lui fournissent les débris ligneux grossiers, conditions qui se trouvent perturbées par l'exploitation forestière. De plus, les zones nouvellement exploitées peuvent constituer des barrières qui entravent le flux génique et réduire la connectivité entre zones d'habitat et populations.

Les aménagements résidentiels et récréatifs sont en train de devenir une nouvelle menace dans les forêts côtières de l'ouest de l'île de Vancouver, entre Sooke et Port Renfrew, d'où sont issues la plupart des mentions du *H. glandulosa* et où l'on trouve la plus grande étendue continue d'habitat propice à l'espèce. Une grande étendue de terres forestières privées (28 000 ha) de cette région a été soustraite à l'entente de licence de propriété forestière de production par le gouvernement de la Colombie-Britannique en 2007, ce qui permet à la société forestière qui gère ces terres (Western Forest Products) de les lotir à des fins de vente (Office of the Auditor General of British Columbia, 2008). Depuis, environ le quart de la propriété a été acheté par une autre société forestière (TimberWest), quelque 2 350 ha ont été achetés par le District régional de la capitale pour agrandir le réseau de parcs et de zones récréatives (ELC, 2010), et une parcelle a été achetée par des promoteurs, mais le reste est encore à vendre. Les répercussions des changements de propriété et, dans certains cas, d'utilisation des terres sur le *H. glandulosa* sont inconnues, mais il pourrait y avoir accroissement des perturbations de son habitat et de ses sous-populations dans l'ensemble de cette région.

**Protection :**

Changement quant à la protection effective :

oui ☐ non ☒

Explication :

Il n'y a aucun changement effectif au chapitre de la protection de l'espèce. Le *Hemphillia glandulosa* a été évaluée « espèce préoccupante » par le COSEPAC en 2003 et figure à l'annexe 1 de la *Loi sur les espèces en péril*. Le plan de gestion exigé par la Loi a été ébauché (BC Ministry of Environment, 2007), sa version définitive étant encore à venir. Il a été recommandé que l'espèce soit placée dans la catégorie des « espèces en péril » aux termes de la *Forest and Range Practices Act* de la Colombie-Britannique. Sa gestion sur les terres forestières publiques relèverait alors de la stratégie de gestion des espèces sauvages désignées (Identified Wildlife Management Strategy [IWMS]). Un compte rendu concernant l'espèce aux fins de l'IWMS est en préparation mais n'a pas encore été affiché.

Des 14 sites considérés comme abritant actuellement l'espèce, deux se trouvent dans des parcs provinciaux (parc provincial Juan de Fuca : ruisseau Parkinson; parc provincial Carmanah-Walbran) et deux (parc régional East Sooke et sentier Galloping Goose près de la rivière Sooke) dans le réseau de parcs et de sentiers du District régional de la capitale; cependant, le site du sentier Galloping Goose se trouve dans l'emprise étroite de ce sentier très fréquenté et est enclavé dans une étendue de terre rurale résidentielle privée. L'espèce a fait l'objet d'une mention en 1984 dans la réserve de parc national Pacific Rim (baie Pachena), mais elle n'y a pas été trouvée depuis malgré des relevés répétés. Les sites restants se trouvent sur des terres privées ou publiques non protégées, utilisées principalement à des fins d'exploitation forestière.

**Immigration de source externe :**

*Immigration de source externe constatée :*

oui ☐ non ☒

Explication :

Aucun changement n'a eu lieu au chapitre de l'immigration de source externe. La probabilité d'une telle immigration demeure nulle, l'espèce n'étant présente au Canada que dans l'île de Vancouver, où elle se trouve séparée par l'océan des populations américaines les plus proches.

**Analyse quantitative :**

*Changement quant à la probabilité de disparition du pays :*

oui ☐ non ☒

Précisions :

Il n'existe aucune analyse quantitative.

**Sommaire et autres points à examiner :** [p. ex. activités de rétablissement]

La limace-sauteuse glanduleuse a été trouvée à 17 sites, dont trois historiques. Les nombreux relevés effectués au cours des dix dernières années dans le sud de l'île de Vancouver n'ont produit que quelques mentions additionnelles. Cependant, une grande quantité d'habitat potentiel n'a pas encore été fouillée dans l'intérieur et sur la côte ouest de l'île. Il existe presque certainement d'autres sites occupés par l'espèce, mais ils demeurent inconnus notamment du fait que cette limace est de petite taille (longueur d'environ 2 cm) et cryptique, ce qui la rend difficile à voir à moins qu'elle ne soit spécifiquement recherchée. La plupart des endroits où on la sait présente et une grande partie de son habitat ne sont pas protégés, et les menaces pesant sur elle se sont accrues dans la portion de la côte ouest de l'île de Vancouver jugée très productive pour l'espèce. Une ébauche de plan de gestion et un compte rendu concernant l'espèce aux fins de la stratégie de gestion des espèces sauvages désignées (Identified Wildlife Management Strategy [IWMS]) ont été préparés par le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique, mais ces plans doivent encore être affichés et mis en œuvre.

**Consultations :**

Les personnes suivantes ont été contactées par courriel.

\*Indique que de l'information a été fournie par l'expert contacté.

Cunnington, David. Décembre 2011. Environnement Canada, Service canadien de la faune, Delta (Colombie-Britannique).

\*Gelling, Lea. Septembre 2011. Conservation Data Centre de la Colombie-Britannique, Ministry of Environment, Victoria (Colombie-Britannique).



- \*Heron, Jennifer. Septembre 2011. Invertebrate Specialist, Ministry of Environment de la Colombie-Britannique, Terrestrial Ecosystems Science Section, Victoria (Colombie-Britannique).
- Reader, Brian. Décembre 2011. Parcs Canada – réserve de parc national des Îles-Gulf, Victoria (Colombie-Britannique).
- \*Sopuck, Lennart. Septembre – novembre 2011. Biologiste, Biolinx Environmental Research Ltd., Sidney (Colombie-Britannique).
- \*Stipeck, Katrina. Novembre 2011 – janvier 2012. B.C. Conservation Data Centre de la Colombie-Britannique, Ministry of Environment, Victoria (Colombie-Britannique).
- Vennesland, Ross. Décembre 2011. Spécialiste du rétablissement des espèces en péril, Parcs Canada – Centre de services de l'Ouest et du Nord, Vancouver (Colombie-Britannique).

**Sources d'information (incluant les références mentionnées dans les annexes) :**

- BC Ministry of Environment. 2007 (ébauche). National management plan for the Warty Jumping-slug, *Hemphillia glandulosa*, in British Columbia, Province of British Columbia, Victoria (Colombie-Britannique).
- Cameron, R.A.D. 1986. Environment and diversities of forest snail faunas from coastal British Columbia, *Malacologia* 27:341–355.
- Cameron, R.A.D. 2001. Communication personnelle avec Robert Forsyth pour le rapport de situation du COSEPAC de 2003 sur la limace-sauteuse glanduleuse, Department of Animal and Plant Sciences, University of Sheffield, Sheffield, ROYAUME-UNI S10 2TN, courriel : robert@vicshef.freeseve.co.uk.
- COSEPAC. 2003. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la limace-sauteuse glanduleuse (*Hemphillia glandulosa*) au Canada, Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa, vii + 22 p.
- ELC (Environmental Law Centre, University of Victoria). 2010. Major Victory for southern Vancouver Island's west coast, site Web : <http://www.elc.uvic.ca/press/TFL-deletions.html> [consulté en janvier 2012, en anglais seulement].
- Hanham, A.W. 1914. Notes on mollusks from British Columbia, *The Nautilus* 28:87–88.
- Long, J.A., S.L. Hazlitt, T.A. Nelson et K. Labere. 2010. Estimating 30-year change in coastal old-growth habitat for a forest-nesting seabird in British Columbia, Canada, *Endangered Species Research* 14:49-59.
- Hanham, A.W. 1926. *Hemphillia malonei* Van., *The Nautilus* 39:143–144.
- Office of the Auditor General of British Columbia. 2008. Removing private land from tree farm licences 6, 19 & 21, Protecting the public interest?, site Web : <http://www.bcauditor.com/pubs/2008/report5/removing-private-land-tree-farm-licences-6-19-25-protecti> [consulté en janvier 2012; en anglais seulement].



- Ovaska, K., R. Forsyth et L. Sopuck. 2001. Surveys for rare and potentially endangered terrestrial gastropods in southwestern British Columbia, April–October 2000, 2001, Fonds de rétablissement des espèces en péril, rapport final, projet n° ESR189 et Habitat faunique Canada, projet n° 10.138F.1R-01102, 23 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2004a. Distribution and status of rare forest slugs in western Canada Results of 2003 and 2004 field seasons, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le Fonds de rétablissement des espèces en péril (World Wildlife Fund et Environnement Canada), 75 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2004b. Terrestrial gastropods as indicators for monitoring ecological effects of variable-retention logging practices, Pre-disturbance surveys at experimental sites, May – November 2003, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour Weyerhaeuser Company Limited, Nanaimo (Colombie-Britannique), 49 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2005. Surveys for terrestrial gastropods in the Pacific Rim, Gulf Islands, and Gwaii Haanas National Park Reserves, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour Parcs Canada, Unité de gestion de la côté de la Colombie-Britannique, Victoria (Colombie-Britannique), 108 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2006a. Surveys for the Blue-grey Taildropper and other gastropods at risk within CRD parks and trail systems in 2006, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le service des parcs du District régional de la capitale, Victoria (Colombie-Britannique), 45 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2006b. Surveys of potential Wildlife Habitat Areas for terrestrial gastropods at risk on Vancouver Island, September - November 2006, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le Ministry of Environment, Victoria (Colombie-Britannique), 37 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2006c. Terrestrial gastropods as focal species for monitoring ecological effects of variable-retention logging practices - Summary of post-logging surveys, 2005 field-season, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour Cascadia Forest Products, Nanaimo (Colombie-Britannique), 40 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2007a. Surveys for the Blue-grey Taildropper slug (*Prophysaon coeruleum*) on federal lands on southern Vancouver Island, BC, fall 2007, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le Programme des ressources naturelles du Service canadien des forêts et de la BFC Esquimalt, Victoria (Colombie-Britannique), 49 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2007b. Surveys for the Blue-grey Taildropper within CRD Parks and Trails System in 2007, rapport d'étape préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le service des parcs du District régional de la capitale, Victoria (Colombie-Britannique), 14 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2007c. Terrestrial gastropods as focal species for monitoring ecological effects of variable-retention logging practices, 2006 field season, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour Western Forest Products, Campbell River (Colombie-Britannique), 45 p.

- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2007d. Surveys for terrestrial gastropods at risk in Pacific Rim National Park Reserve, 2006, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour Parcs Canada, Centre de services de l'Ouest et du Nord, Victoria (Colombie-Britannique), 44 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2008a. Summary of fieldwork associated with COSEWIC status report for Threaded Vertigo, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le COSEPAC (Sous-comité de spécialistes des mollusques), COSEPAC, Ottawa (Ontario), 13 p. + annexes.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2008b. Surveys for the Blue-grey Taildropper and other gastropods at risk within the CRD Parks and Trails System in 2008, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le service des parcs du District régional de la capitale, Victoria (Colombie-Britannique), 61 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2008c. Terrestrial gastropods as focal species for monitoring ecological effects of variable-retention logging practices, Synopsis of the complete project and results for the 2007 field season, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour Western Forest Products, Campbell River (Colombie-Britannique), 39 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2009a. Surveys for the Blue-grey Taildropper and other gastropods at risk within the CRD Regional Parks and Trails System in 2009, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le service des parcs du District régional de la capitale, Victoria (Colombie-Britannique), 36 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2009b. Surveys for the Blue-grey Taildropper and other gastropods at risk at DND's Royal Roads property, autumn 2009, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le ministère de la Défense nationale, Sécurité et environnement de la Formation (BFC Esquimalt), Victoria (Colombie-Britannique), 12 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2009c. Surveys for the Blue-grey Taildropper slug (*Prophysaon coeruleum*) on federal lands on southern Vancouver Island in 2008, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le Programme des ressources naturelles du Service canadien des forêts et de la BFC Esquimalt, Victoria (Colombie-Britannique), 124 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2010. Surveys for the Blue-grey Taildropper and other gastropods at risk with focus on Capital Regional District Parks, fall 2010, rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le Habitat Acquisition Trust, Victoria (Colombie-Britannique), 31 p.
- Ovaska, K., et L. Sopuck. 2011. Surveys for the Blue-grey Taildropper and other gastropods at risk with focus on Capital Regional District Parks, fall 2011. rapport préparé par Biolinx Environmental Research Ltd. pour le Habitat Acquisition Trust, Victoria (Colombie-Britannique), 30 p.
- Pilsbry, H.A. 1948. Land Mollusca of North America (north of Mexico), *The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Monograph* 3, 2(2): i-xxvii, 521-1113.

Reise, H. 2001. Communication personnelle avec Robert Forsyth pour le rapport de situation du COSEPAC de 2003 sur la limace-sauteuse glanduleuse, Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz, PF 300 154, 02806 Görlitz, ALLEMAGNE, tél. : +49(0)3581/4760410, facsimilé : 4760101, courriel : smng.reise@t-online.de.

Taylor, G.W. 1900. *Hemphillia glandulosa* – A slug new to the Canadian list, *The Ottawa Naturalist* 14:150–151.

Wilke, T. 2004. Genetic and analytical analysis of the jumping-slugs – Final report (contract 43-05G2-1-10086), rapport préparé pour l'Olympic National Forest, Olympia (Washington), États-Unis, 26 p.

Auteure du sommaire du statut de l'espèce : Kristiina Ovaska



## RÉSUMÉ TECHNIQUE

### *Hemphillia glandulosa*

Limace sauteuse glanduleuse

Warty Jumping-slug

Répartition au Canada : Colombie-Britannique

#### Données démographiques

Durée d'une génération	Probablement un an
Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] du nombre total d'individus matures? - Un déclin est possible vu la perte d'habitat, mais on ne dispose pas d'information à ce sujet.	On ne sait pas, mais c'est possible.
Pourcentage estimé de déclin continu du nombre total d'individus matures sur [cinq ans ou deux générations].	Inconnu
Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d'augmentation] du nombre total d'individus matures au cours des [dix dernières années ou trois dernières générations].	Inconnu
Pourcentage [prévu ou présumé] [de réduction ou d'augmentation] du nombre total d'individus matures au cours des [dix prochaines années ou trois prochaines générations].	Inconnu
Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d'augmentation] du nombre total d'individus matures au cours de toute période de [dix ans ou trois générations] commençant dans le passé et se terminant dans le futur.	Inconnu
Est-ce que les causes du déclin sont clairement réversibles et comprises et ont effectivement cessé?	Non
Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d'individus matures?	Non

#### Information sur la répartition

Superficie estimée de la zone d'occurrence - Calculée en janvier 2011 par Katrina Stipek, du Conservation Data Centre de la Colombie-Britannique, à l'aide de la méthode de détermination par enveloppe alpha ( <i>alpha-hull method</i> )	5 127 km <sup>2</sup>
Indice de zone d'occupation (IZO) (Toujours fournir une valeur calculée à partir d'une grille à carrés de 2 km de côté). - Calculé le 13 février 2013 par Jenny Wu, d'Environnement Canada, deux mentions historiques (antérieures à 1980) étant exclues. - Cette valeur est fondée sur les occurrences connues; l'IZO est en fait plus élevé étant donné que beaucoup d'habitat potentiel n'a pas encore été fouillé et qu'il est peu probable que l'espèce soit détectée quand elle n'est pas spécifiquement recherchée. Cependant, vu la répartition éparse de l'espèce et son absence apparente sur de vastes étendues de forêt sèche dans la zone biogéoclimatique côtière à douglas dans le sud et l'est de l'île de Vancouver, l'IZO n'est très probablement pas de plus de 2 000 km <sup>2</sup> , soit 39 % de la zone d'occurrence.	104 km <sup>2</sup> (IZO discontinu); l'IZO continu est plus élevé mais très probablement de moins de 2 000 km <sup>2</sup>



La population totale est-elle gravement fragmentée? - Il n'existe aucune information sur la viabilité des populations. L'habitat est largement fragmenté par des facteurs naturels et anthropiques, mais la petite taille de l'espèce pourrait lui permettre de se maintenir dans de petites parcelles d'habitat.	On ne sait pas.
Nombre de localités* - Chacun des 14 sites (3 sites historiques ignorés) constitue probablement une localité distincte parce que chacun se trouve sous un régime de gestion différent et est sujet à des menaces différentes.	14, selon les occurrences connues
Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] de la zone d'occurrence?	Non
Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] de l'indice de zone d'occupation? - Un déclin est possible vu la perte d'habitat, mais on ne dispose pas d'information à ce sujet.	Probablement
Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] du nombre de populations? - Un déclin est possible vu la perte d'habitat, mais on ne dispose pas d'information à ce sujet.	Possiblement
Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] du nombre de localités*? - Un déclin est possible vu la perte d'habitat, mais on ne dispose pas d'information à ce sujet.	Possiblement
Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] de [la superficie, l'étendue ou la qualité] de l'habitat?	Oui
Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de populations?	Non
Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de localités*?	Non
Y a-t-il des fluctuations extrêmes de la zone d'occurrence?	Non
Y a-t-il des fluctuations extrêmes de l'indice de zone d'occupation?	Non

#### Nombre d'individus matures dans chaque population

Population	Nombre d'individus matures
Total	Inconnu; probablement des milliers

#### Analyse quantitative

La probabilité de disparition de l'espèce de la nature est d'au moins [20 % sur 20 ans ou 5 générations, ou 10 % sur 100 ans].	Analyse non réalisée.
--	-----------------------

#### Menaces (réelles ou imminentes pour les populations ou leur habitat)

Destruction, dégradation et fragmentation de l'habitat par les activités forestières et le développement résidentiel et récréatif.
--

#### Immigration de source externe (immigration de l'extérieur du Canada)

Situation des populations de l'extérieur	
Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle possible?	Non
Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour survivre au Canada?	Probablement

\* Voir « Définitions et abréviations » sur le [site Web du COSEPAC](#) et [IUCN 2010](#) (en anglais seulement) pour obtenir des précisions sur ce terme.

Y a-t-il suffisamment d'habitat disponible au Canada pour les individus immigrants?	On ne sait pas.
La possibilité d'une immigration depuis des populations externes existe-t-elle?	Non

#### Historique du statut

Espèce désignée préoccupante en mai 2003. Statut réexaminé et confirmé en mai 2013.

#### Statut et justification de la désignation

<b>Statut :</b> Espèce préoccupante	<b>Code alphanumérique :</b> Sans objet
<b>Justification de la désignation :</b> Cette petite limace a une aire de répartition restreinte et fragmentée sur l'île de Vancouver, où elle atteint la limite septentrionale de son aire de répartition. La perte et la fragmentation de son habitat, principalement dues à l'exploitation forestière, perturbent les conditions d'ombre et d'humidité du tapis forestier et les débris ligneux grossiers essentiels aux limaces, et peuvent restreindre la dispersion. Le développement résidentiel et récréatif est considéré comme une nouvelle menace le long de la côte sud-ouest de l'île. Le faible nombre de populations dispersées l'expose aux perturbations naturelles et anthropiques.	

#### Applicabilité des critères

##### **Critère A** (déclin du nombre total d'individus matures) :

Possible vu la perte d'habitat, mais l'ampleur du déclin demeure inconnu.

##### **Critère B** (petite aire de répartition, et déclin ou fluctuation) :

La zone d'occurrence et l'indice de zone d'occupation (IZO) sont inférieurs aux seuils critiques, mais le nombre de localités est supérieur aux seuils, on ne peut se prononcer avec assurance sur la question de savoir si la population est gravement fragmentée, et il n'y a pas de fluctuations extrêmes.

##### **Critère C** (nombre d'individus matures peu élevé et en déclin) :


La taille de la population est inconnue mais très probablement supérieure aux seuils, et on ne sait pas s'il y a des déclins.

##### **Critère D** (très petite population totale ou répartition restreinte) :

La taille de la population est inconnue mais très probablement supérieure au seuil.

##### **Critère E** (analyse quantitative) :

Analyse non réalisée à cause du manque de données sur les paramètres clés.



Veuillez voir la traduction française ci-dessous :

After 1985 = Après 1985

Before 1985 = Avant 1985

Vancouver Island = Île de Vancouver

USA = États-Unis

Figure 1. Répartition canadienne de la limace-sauteuse glanduleuse, dans le sud de l'île de Vancouver.



**Veillez voir la traduction française ci-dessous :**

Database = Base de données

All Records Events = Toutes les mentions

Status = Statut

After 1985 = Après 1985

Before 1985 = Avant 1985

Index of Area of Occupancy = Indice de zone d'occupation

IAO\_WartyJumpingslug = IAO\_WartyJumpingslug

IAO (2 km x 2 km grids) : 26 grids = 104 km<sup>2</sup> = IZO (carrés de 2 km de côté) : 26 carrés = 104 km<sup>2</sup>

Wart Jumping-slug = Limace-sauteuse glanduleuse

Include Historical ... = Inclure les observations historiques dans le calcul de la zone d'occurrence mais les exclure dans celui de l'IZO

Calculate continuous... = Calculer l'IZO continu en reliant le groupe de mentions du sud-ouest entre les sites 5 et 15

Index of Area of Occupancy (2 km x 2 km grids) : 26 grids = 104 km<sup>2</sup> = Indice de zone d'occupation (carrés de 2 km de côté) : 26 carrés = 104 km<sup>2</sup>

IAO based on discrete... = IZO discontinu fondé sur les carrés avec mentions

IAO based on continuous = IZO continu entre les sites 5, 9 et 15

Figure 2. Répartition canadienne de la limace-sauteuse glanduleuse, dans le sud de l'île de Vancouver. Les carrés rouges sont des carrés de grille de 2 km de côté avec mentions de l'espèce. Les triangles numérotés représentent des mentions historiques, dont les caractéristiques sont présentées à l'annexe 2. Carte préparée le 13 février 2013 par Jenny Wu, d'Environnement Canada.



**Annexe 1. Sommaire des activités de recherche de gastéropodes terrestres menées dans l'île de Vancouver et les environs depuis l'évaluation antérieure de la limace-sauteuse glanduleuse réalisée par le COSEPAC en 2003.**

Année	Zone du relevé	Nombre de propriétés	Méthode de relevé	Effort d'échantillonnage	Nombre de sites où l'espèce a été trouvée	Nombre d'individus trouvés	Commentaires	Source
2011	Parcs du District régional de la capitale; 1 propriété résidentielle privée	9	Abris de carton	16 transects; 313 abris inspectés à plusieurs reprises; 900 retournements d'abris	1	1		Ovaska et Sopuck, 2011
2010	Parcs du District régional de la capitale; 1 propriété résidentielle privée	6	Abris de carton	18 transects; 370 abris inspectés à plusieurs reprises; 1 460 retournements d'abris	0	0		Ovaska et Sopuck, 2010
2009	Parcs du District régional de la capitale	7	Abris de carton	22 transects; 440 abris inspectés à plusieurs reprises; 1 620 retournements d'abris	1	1		Ovaska et Sopuck, 2009a
2009	Propriété du MDN à la Royal Road University	1	Abris de carton	5 transects; 100 abris inspectés à plusieurs reprises; 400 retournements d'abris	0	0		Ovaska et Sopuck, 2009b
2008	Terres fédérales dans le District régional de la capitale	6	Abris de carton	3 carrés échantillonnés intensivement et 26 transects; total de 5 540 retournements d'abris	0	0		Ovaska et Sopuck, 2009c
2008	Île de Vancouver (côtes sud et est); Sunshine Coast dans la partie continentale de la Colombie-Britannique	17	Recherches de durée limitée	20,3 heures-personnes (16,1 h à 13 sites dans l'île de Vancouver; 4,2 h à 4 sites sur la Sunshine Coast)	0	0		Ovaska et Sopuck, 2008a
2008	Parcs du District régional de la capitale	6	Abris de carton	22 transects; 440 abris inspectés à plusieurs reprises; 2 360 retournements d'abris	0	0		Ovaska et Sopuck, 2008b
2007	Île de Vancouver (centre-nord, Moakwa); Sunshine Coast (île Goat)	2 (38 sous-sites)	Abris de carton	1 488 abris à 384 stations d'échantillonnage inspectés à plusieurs reprises; 5 952 retournements d'abris (688 abris et 2 752 retournements au site de l'île de Vancouver)	0	0	Sites d'environ 100 ha surveillés intensivement dans le cadre d'un projet expérimental de foresterie (relevés après coupe et expérience concernant les rives)	Ovaska et Sopuck, 2008c
2007	Terres fédérales dans le District régional de la capitale	6	Abris de carton	23 transects; 460 abris; total de 1 840 retournements d'abris	0	0		Ovaska et Sopuck, 2007a
2007	Parcs du District régional de la capitale	3	Abris de carton; recherches de durée limitée	6 transects; 120 abris; total de 260 retournements d'abris; 160 minutes-personnes passées à fouiller le tapis forestier	0	0		Ovaska et Sopuck, 2007b

Année	Zone du relevé	Nombre de propriétés	Méthode de relevé	Effort d'échantillonnage	Nombre de sites où l'espèce a été trouvée	Nombre d'individus trouvés	Commentaires	Source
2006	Île de Vancouver (nord; Port McNeill); Haida Gwaii	2 (40 sous-sites)	Abris de carton	1 600 abris à 400 stations d'échantillonnage inspectés à plusieurs reprises; 7 200 retournements d'abris (800 abris et 4 800 retournements au site de l'île de Vancouver)	0	0	Sites d'environ 100 ha surveillés intensivement dans le cadre d'un projet expérimental de foresterie (relevés après coupe)	Ovaska et Sopuck, 2007c
2006	Île de Vancouver (côte ouest)	2 (21 sous-sites)	Recherches de durée limitée (jour et nuit); abris de carton	96,9 heures-personnes, dont 32,7 h passées à inspecter à plusieurs reprises 480 abris de carton à 12 transects (1 920 retournements d'abris)	0	0	Réserve de parc national Pacific Rim (secteurs de Long Beach et du sentier West Coast)	Ovaska et Sopuck, 2007d
2006	Parcs du District régional de la capitale	5	Abris de carton	20 transects; 400 abris; total de 1 390 retournements d'abris	1	2		Ovaska et Sopuck, 2006a
2006	Île de Vancouver (sud et centre, avec accent mis sur la côte ouest)	30	Recherches de durée limitée	40,6 heures-personnes de recherche intensive	3	8		Ovaska et Sopuck, 2006b
2005	Île de Vancouver (nord, Tsitika); Sunshine Coast (lac Horseshoe)	2 (35 sous-sites)	Abris de carton	1 400 abris à 350 stations d'échantillonnage inspectés à plusieurs reprises; 2 580 retournements d'abris (800 abris et 2 400 retournements au site de l'île de Vancouver)	0	0	Sites d'environ 100 ha surveillés intensivement dans le cadre d'un projet expérimental de foresterie (relevés après coupe)	Ovaska et Sopuck, 2006c
2003 2004	Île de Vancouver (côte ouest); Îles Gulf (Pender Nord et Satuma)	Île de Vancouver : 2 (35 sous-sites) Îles Gulf : 15	Recherches de durée et d'étendue limitées (jour et nuit); abris de carton	Île de Vancouver : 119,7 heures-personnes Îles Gulf : 44,5 heures-personnes; inspection de 160 abris de carton à 8 transects	0	0	Relevés dans la réserve de parc national Pacific Rim (secteurs de Long Beach et du sentier West Coast) et dans la réserve de parc national des Îles-Gulf (Îles Pender Nord et Satuma). Les relevés additionnels effectués à Haida Gwaii dans le cadre de ces travaux ne sont pas inclus ici.	Ovaska et Sopuck, 2005
2003 2004	Île de Vancouver (sud); basses-terres continentales	43	Recherches de durée et d'étendue limitées (jour et nuit); abris de carton	55,3 heures-personnes; 260 abris de carton à 28 sites inspectés à plusieurs reprises (880 retournements d'abris)	2	5	La plupart des sites (39) se trouvaient dans l'île de Vancouver; 4 se trouvaient dans les basses-terres continentales. Les relevés additionnels effectués à Haida Gwaii dans le cadre de ces travaux ne sont pas inclus ici.	Ovaska et Sopuck, 2004a

Année	Zone du relevé	Nombre de propriétés	Méthode de relevé	Effort d'échantillonnage	Nombre de sites où l'espèce a été trouvée	Nombre d'individus trouvés	Commentaires	Source
2003	Île de Vancouver (centre-nord, Moakwa); Sunshine Coast (Île Goat)	2 (36 sous-sites)	Abris de carton	1 440 abris à 360 stations d'échantillonnage inspectés à plusieurs reprises; 4 320 retournements d'abris (480 abris et 1 440 retournements au site de l'île de Vancouver)	0	0	Sites d'environ 100 ha surveillés intensivement dans le cadre d'un projet expérimental de foresterie (relevés après coupe)	Ovaska et Sopuck, 2004b

**Annexe 2. Mentions du *Hemphillia glandulosa* au Canada jusqu'en 2011; tirées du rapport de situation du COSEPAC (2003), des dossiers du Conservation Data Centre de la Colombie-Britannique, et des relevés de Biolinx Environmental Research Ltd.**

Numéro du site	Lieu du site	Latitude (N)	Longitude (O)	Statut des terres	Date	Nombre de limaces	Effort de recherche	Statut de la population (année de la dernière observation)	Source de la mention
Mentions compilées pour le rapport de situation du COSEPAC (2003) :									
1	À environ 3 milles [4,8 km] de l'embouchure de la Nanaimo	49°06'	123°52'	Privé	1 <sup>er</sup> oct. 1900	12	Inconnu	Historique seulement; habitat largement modifié	Taylor, 1900 (réitéré par Hanham, 1926; Pilsbry, 1948) <sup>1</sup>
2	Rivière Corvichan [sic : Cowichan]	48°46,3'	123°42'	Privé	Inconnue [à deux occasions; avant 1913?]	« seulement en faibles nombres » [traduction]	Inconnu	Historique seulement	Hanham 1914 (réitéré par Hanham, 1926; Pilsbry 1948)
3a	« Localité 31 » = baie Pachena	48°47,4'	125°07,0'	Fédéral (réserve de parc national)	Août 1984	Non disponible	Inconnu	Historique seulement; relevés récents effectués dans les environs	Cameron, 1986 [comm. pers., 2001]
3b	« Localité 32 » = baie Pachena	48°45,7'	125°07,4'	Fédéral (réserve de parc national)	Août 1984	Non disponible	Inconnu	Historique seulement; relevés récents effectués dans les environs	Cameron, 1986 [comm. pers., 2001]
4	« Localité 33 » = Sarita, au sud du mont Blenheim	48°53,75'	124°57,47'	Terre publique de la Colombie-Britannique	Août 1984	Non disponible	Inconnu	Historique mais encore présente dans la région (2001; voir site 8)	Cameron, 1986 [comm. pers., 2001]
5	Chemin Cerantes près de la baie Snuggery, Port Renfrew	48°33,17'	124°25,29'	Privé (rural résidentiel)	24 oct. 1998	4	Environ 30 minutes-personnes	Réobservée en 2001	RBCM <sup>2</sup> 998-00326-002
5	Chemin Cerantes près de la baie Snuggery, Port Renfrew	48°33,17'	124°25,29'	Privé (rural résidentiel)	11 oct. 2001	6	60 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	SMNG <sup>3</sup> (Reise, comm. pers., 2001)
6	Chemin Parkinson Creek à la route 14	48°32,53'	124°21,94'	Terre publique de la Colombie-Britannique (parc provincial Juan de Fuca)	14 avr. 2000	3 (1 spécimen au RBCM)	90 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska <i>et al.</i> , 2001; RBCM 000-00132-002 <sup>3</sup>
7a	Vallée du ruisseau Camanah	48°39,6'	124°41,6'	Terre publique de la Colombie-Britannique (parc)	27 sept. 2000	1	60 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska <i>et al.</i> , 2001
7b	Vallée du ruisseau Camanah	48°39,4'	124°42,2'	Terre publique de la Colombie-Britannique	27 sept. 2000	1	15 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska <i>et al.</i> , 2001

<sup>1</sup> Lieu approximatif

<sup>2</sup> Collection du Royal British Columbia Museum

<sup>3</sup> Collection du Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz



Numéro du site	Lieu du site	Latitude (N)	Longitude (O)	Statut des terres	Date	Nombre de limaces	Effort de recherche	Statut de la population (année de la dernière observation)	Source de la mention
				(parc)					
8	Au nord de Sarifa	48°44,4'	125°01,5'	Terre publique de la Colombie-Britannique (exploitation forestière)	23 mai 2001	2	60 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska <i>et al.</i> , 2001
9a	Bras de la rivière Sombrio, route 14, à environ 11 km au sud-est de Port Renfrew	48°30,6'	124°17,44'	Terre publique de la Colombie-Britannique	15 juin 2001	1	30 minutes-personnes	En 2006, l'espèce a été trouvée de l'autre côté de la route	Ovaska <i>et al.</i> , 2001
10	Rive sud, lac Holyoak, mont Brenton	48°51,72'	123°45,27'	Privé (exploitation forestière)	25 août 2001	3	60 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska <i>et al.</i> , 2001
11	Lac anonyme, mont Hooper, à environ 20 km au nord-ouest de Youbou	48°59,99'	124°29,32'	Privé (exploitation forestière)	10 sept. 2001	3	100 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska <i>et al.</i> , 2001
12	Ruisseau Muir, route 14, à environ 5 km à l'est de Shirley	48°22,81'	123°51,94'	Privé	11 oct. 2001	> 15	Environ 30 minutes-personnes	2003; continue d'être facilement trouvée	SMNG <sup>4</sup> (Reise, comm. pers., 2001)
12	Ruisseau Muir, route 14, à environ 5 km à l'est de Shirley	48°22,81'	123°51,94'	Privé	16 nov. 2001	7	180 minutes-personnes	2003; continue d'être facilement trouvée	Ovaska <i>et al.</i> , 2001
13	Près du lac Keating, au sud-ouest de Duncan	48°44,4'	123°47,8'	Privé (exploitation forestière)	8 nov. 2001	1	1 jour par 5 personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska <i>et al.</i> , 2001
13	Près du lac Keating, au sud-ouest de Duncan	48°44,4'	123°47,8'	Privé (exploitation forestière)	26 nov. 2001	1	Environ 120 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska <i>et al.</i> , 2001
Mentions obtenues depuis l'évaluation précédente de la situation de l'espèce :									
9b	Ruisseau Sombrio, du côté est de la route 14 (site 14-06)	48°30,89'	124°17,22'	Terre publique de la Colombie-Britannique (exploitation forestière)	10 nov. 2006	2	66 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska et Sopuck, 2006a
12	Ruisseau Muir, près de Shirley (parcelle 2)	48°22,90'	123°52,08'	Privé	22 nov. 2003	4	40 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska et Sopuck, 2004
14a	Parc régional East Sooke, anse Anderson (site 5)	48°21,68'	123°39,64'	Parc du District régional de la capitale	10 oct. 2003	1	40 minutes-personnes	2009 près du même site; 2011 dans un secteur différent du parc	Ovaska et Sopuck, 2004
14b	Parc régional East Sooke, anse Anderson	48°21,50'	123°39,73'	Parc du District régional de la capitale	3 nov. 2009	1	Inspection de 20 abris de carton quatre fois	2011 dans un secteur différent du parc	Ovaska et Sopuck, 2009

<sup>4</sup> Collection du Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz

Numéro du site	Lieu du site	Latitude (N)	Longitude (O)	Statut des terres	Date	Nombre de limaces	Effort de recherche	Statut de la population (année de la dernière observation)	Source de la mention
14c	Parc régional East Sooke, Park Heights	48°20,34'	123°39,78'	Parc du District régional de la capitale	17 nov. 2011	1	Inspection de 20 abris de carton trois fois	Sans objet	Ovaska et Sopuck, 2011
15a	Ruisseau Noyse, tributaire du ruisseau Loss, à l'est de la route 14, parcelle 1 (site 12-06)	48°30,39'	124°14,19'	Terre publique de la Colombie-Britannique (exploitation forestière)	20 oct. 2006	5	120 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska et Sopuck, 2006a
15b	Ruisseau Noyse, tributaire du ruisseau Loss, à l'est de la route 14, parcelle 2 (site 13-06)	48°30,90'	124°13,71'	Terre publique de la Colombie-Britannique (exploitation forestière)	20 oct. 2006	1	90 minutes-personnes	Pas de relevés postérieurs	Ovaska et Sopuck, 2006a
16	Station marine de Bamfield	48°49,90'	125°8,01'	Privé	26 juill. 2007	1			CDC EO 15
16	Station marine de Bamfield	48°49,90'	125°8,01'	Privé	13 août 2008	1			CDC EO 15
17	Sentier Galloping Goose au chemin Sooke River, Sooke (parcelle 3)	48°24,91'	123°42,33'	Sentier du District régional de la capitale (bande étroite de 15 m adjacente au sentier), bordé par une terre privée	25 oct. 2006	1	Inspection de 100 abris de carton quatre fois	Site revisité à plusieurs reprises en 2007 et 2008, mais l'espèce n'y a pas été trouvée	Ovaska et Sopuck, 2006b
17	Sentier Galloping Goose au chemin Sooke River, Sooke (parcelle 3)	48°24,91'	123°42,33'	Sentier du District régional de la capitale (bande étroite de 15 m adjacente au sentier), bordé par une terre privée	6 nov. 2006	1	Inspection de 100 abris de carton quatre fois	Site revisité à plusieurs reprises en 2007 et 2008, mais l'espèce n'y a pas été trouvée	Ovaska et Sopuck, 2006b

†Approximatif

\*Selon des cartes et des descriptions des sites de R. Cameron (comm. pers. avec R. Forsyth en 2001).



### HISTORIQUE DU COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d'une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d'une classification nationale des espèces sauvages en péril qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide. En 1978, le COSEPAC (alors appelé Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. En vertu de la *Loi sur les espèces en péril* (LEP) promulguée le 5 juin 2003, le COSEPAC est un comité consultatif qui doit faire en sorte que les espèces continuent d'être évaluées selon un processus scientifique rigoureux et indépendant.

### MANDAT DU COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés ou d'autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées aux espèces indigènes comprises dans les groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

### COMPOSITION DU COSEPAC

Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsables des espèces sauvages des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l'Agence Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans et le Partenariat fédéral d'information sur la biodiversité, lequel est présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres scientifiques non gouvernementaux et des coprésidents des sous-comités de spécialistes des espèces et du sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

### DÉFINITIONS (2013)

Espèce sauvage	Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d'animal, de plante ou d'une autre organisme d'origine sauvage (sauf une bactérie ou un virus) qui est soit indigène du Canada ou qui s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.
Disparue (D)	Espèce sauvage qui n'existe plus.
Disparue du pays (DP)	Espèce sauvage qui n'existe plus à l'état sauvage au Canada, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays imminente.
Menacée (M)	Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants ne sont pas renversés.
Préoccupante (P)**	Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle.
Non en péril (NEP)***	Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître étant donné les circonstances actuelles.
Données insuffisantes (DI)****	Une catégorie qui s'applique lorsque l'information disponible est insuffisante (a) pour déterminer l'admissibilité d'une espèce à l'évaluation ou (b) pour permettre une évaluation du risque de disparition de l'espèce.

\* Appelée « espèce disparue du Canada » jusqu'en 2003.

\*\* Appelée « espèce en danger de disparition » jusqu'en 2000.

\*\*\* Appelée « espèce rare » jusqu'en 1990, puis « espèce vulnérable » de 1990 à 1999.

\*\*\*\* Autrefois « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».

\*\*\*\*\* Catégorie « DSIDD » (données insuffisantes pour donner une désignation) jusqu'en 1994, puis « indéterminé » de 1994 à 1999. Définition de la catégorie (DI) révisée en 2006.



Environnement  
Canada

Environment  
Canada

Service canadien  
de la faune

Canadian Wildlife  
Service

Canada

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada assure un appui administratif et financier complet au Secrétariat du COSEPAC.